

Micromedex

사용 설명서

목차


제 1장: 시작하기 전에	3
1. 호환성 보기 설정	3
2. 언어 설정	3
3. 홈페이지 접속	4
4. 나의 구독 목록 보기	5
 제 2장: Micromedex 사용하기	 6
1. 홈페이지 둘러보기	6
2. 통합 검색 기능	6
3. 검색 결과 화면	9
4. 의약품 검색 도구	10
① 약물 상호작용 도구 (Drug Interactions)	10
② 주사제 호환성 도구 (IV Compatibility)	11
③ 약물 식별 정보 도구 (Drug ID)	12
④ 약물 비교 정보 도구 (Drug Comparison)	13
⑤ 환자 교육자료 (CareNotes)	13
⑥ 계산기(Calculators)	15
 제 3장: 모바일 Micromedex 이용하기	 16

제 1장: 시작하기 전에

1. 호환성 보기 설정

Micromedex를 원활하게 사용하기 위해 사용 전 호환성 보기 설정을 합니다. 화면 오른쪽 상단의 **도구 > 호환성 보기 설정** 으로 들어가 설정 화면 하단의 세 개의 체크박스 중 첫 번째 체크박스 (호환성 보기에서 모든 웹 사이트 표시)를 해제합니다. 아래와 같이 설정된 것을 확인한 후 '닫기'를 누르고 F5 혹은 새로고침을 해주세요.

[호환성 보기 설정 화면]




2. 언어 설정

Micromedex는 한국어, 영어, 독일어, 중국어, 이탈리아어, 스페인어, 포르투갈어를 지원하여 사용자의 필요에 따라 원하는 언어로 선택하여 이용할 수 있습니다.

언어 선택 및 변경을 위해 화면 오른쪽 상단의 **도구 > 인터넷 옵션 > 언어 > "언어 추가" > "해당 언어를 맨 위로 이동" > 확인 > 적용** 순서대로 설정합니다.


[언어 설정 화면]



3. 홈페이지 접속

Internet Explorer를 재 실행한 후 주소 창에 Micromedex URL(www.micromedexsolutions.com)를 입력하고 접속합니다. 로그인 정보를 입력 후 실행합니다.


[Micromedex 들어가기]



4. 나의 구독 목록 보기

홈페이지 오른쪽 상단에 '나의 구독 목록 보기(My Subscription)'로 들어가면 현재 귀하의 기관에서 구독하고 있는 마이크로메덱스 DB 목록과 미구독 DB 목록을 확인하실 수 있습니다.

[홈페이지 내 My Subscription 위치]



[나의 구독 목록 보기 화면]

My Subscription

×

KIMS Co. Ltd (Customer #: 662570001)

Subscribed

Micromedex applications

- ✔ Alternative Medicine
- ✔ America's Poison Centers generic codes in POISINDEX
- ✔ Detailed Drug Information for the Consumer
- ✔ DISEASEDEX™ Emergency Medicine
- ✔ DISEASEDEX™ General Medicine
- ✔ DRUGDEX System
- ✔ Imprint Codes in Identidex
- ✔ Index Nominum
- ✔ Interaction Checking
- ✔ IV Compatibility
- ✔ Lab Advisor
- ✔ MARTINDALE
- ✔ NeoFax®
- ✔ P&T QUIK Reports
- ✔ Pediatrics
- ✔ POISINDEX Managements
- ✔ POISINDEX System
- ✔ RED BOOK
- ✔ REPRORISK System
- ✔ TOXES System

Not Subscribed

Micromedex applications

- Ⓢ AI in MDX- Beta
- Ⓢ API CareNotes and DrugNotes
- Ⓢ API In-Depth Drug
- Ⓢ API Summary Drug
- Ⓢ Dental & Oral Health Resources
- Ⓢ Micromedex AI-Powered Search
- Ⓢ Micromedex Assistant for Mobile Browsers
- Ⓢ Micromedex Assistant Integrated Delivery
- Ⓢ Micromedex Pharmaceutical Knowledge
- Ⓢ PharmacyXpert

Complimentary add-ons

N/A

Stand-alone resources

Print


Close

제 2장: Micromedex 사용하기

1. 홈페이지 둘러보기

Micromedex 홈페이지에는 중앙에 의약품 검색을 빠르게 도와줄 수 있는 '통합검색 창'과 상단에 사용자가 주로 사용하는 '의약품 검색 도구'가 있습니다. 하단에는 '최신 뉴스(Latest News)', '사용자 지원(Support & Training)', 정보 소스(Resources)'를 제공하고 있습니다.

[Micromedex 홈페이지]



2. 통합 검색 기능


Micromedex 통합검색 창을 통해 검색 시 약물(Drug), 질병(Disease), 독성(Toxicology)정보로 제한하여 검색할 수 있습니다. 통합검색 창에서는 성분명, 제품명, 약물 계열명, 질병명 등 다양한 키워드로 검색이 가능합니다. 그리고 Chat-bot에서 또한 원하시는 내용을 단어 혹은 문장으로도 검색하실 수 있습니다.

예1. Rivaroxaban / Xarelto / Factor Xa Inhibitor / Deep Venous Thrombosis

예2. Drugs That Treat Gastroenteritis

예3. Black Box Warning or BBW

[통합 검색 창]




1) 자동완성기능

자동완성기능을 통해 해당 검색 키워드의 용법, 이상반응, 적응증, 상호작용 정보로 바로 연결되어 들어갈 수 있습니다.

[자동완성기능 예시]

Search drug, disease, toxicology and more




2) 유사검색어 제시

검색어의 철자가 잘못되거나 일부분만 입력하게 된 경우, '유사검색어'를 제시해 줌으로써 사용자가 원하는 검색어를 찾아낼 수 있도록 도와줍니다.

[유사검색어 예시]


Your search for "athma" did not match any documents.
Did you mean: **asthma**, **atma**

[Chat-bot 기능 창]




1) 특정 검색어 입력 후 활용

통합검색창에서 입력한 방법과 동일하게 입력을 하게 되면 무엇을 찾는 것인지 묻는 창이 뜨게 되며, 여기서 원하시는 상세한 정보를 찾아가실 수 있습니다.



2) 문장 검색어 기능


단어 검색 뿐만 아니라, 문장을 직접 입력하신 경우에도 이와 관련된 내용을 확인하실 수 있습니다. 이 경우에는 링크를 타고 검색을 하지 않고 다음과 같이 바로 결과가 출력됩니다.



3. 검색 결과 화면


통합검색 창을 통해 검색어를 입력 후 엔터를 누르면 검색 결과 화면으로 바로 이어지며, 사용자 친화적으로 구성된 검색 결과 화면에서는 아래와 같이 다양한 기능들을 제공하고 있습니다.

[검색 결과 화면 (1)]



1. 성분명 하단에는 약물 계열(Drug Classes)과 투여경로(Routes) 정보를 제공합니다.
2. 검색 결과는 요약정보(Quick Answers), 상세정보(In-Depth Answers), 전체 검색결과(All Results)로 나누어 제공합니다.
3. 왼쪽 네비게이션을 이용하여 해당 성분의 원하는 특정 정보로 바로 이동할 수 있습니다.
4. 오른쪽 상단 검색창에서는 마지막 검색 키워드가 저장되어 있어 빠른 검색을 가능하게 합니다.
5. 검색창 아래에는 해당 성분의 염/염기를 선택할 수 있는 창이 있으며 특정 염/염기 선택 시 해당 정보로 바로 연결됩니다.
6. 오른쪽 연관 검색결과(Related Results)에서는 같은 검색 키워드를 이용해 질병 등 다른 DB로 검색을 제한했을 때의 검색 결과 및 Martindale, PDR 등 타 정보원의 정보를 볼 수 있습니다.
7. 문서 내 숫자를 클릭할 시에, PubMed와 관련된 링크를 알려드립니다.

[검색 결과 화면 (2)]



1. 요약정보(Quick Answers)와 상세정보(In-Depth Answers)는 연결 링크를 통해 같은 정보 분류에서 서로 이동이 가능합니다.
2. 상세정보 화면에서는 전체 문서보기(View Full Document) 및 인쇄(Print)기능을 제공합니다.
3. 왼쪽 네비게이션과 오른쪽 연관 검색결과는 접거나 펼칠 수 있어 사용자가 원하는 화면 구성으로 이용할 수 있습니다.
4. 전체 검색결과(All Results)에서는 연관 검색결과(Related Results)와 특정 DB로 제한하는 검색 결과를 모두 보여줍니다.

4. 의약품 검색 도구

자주 사용하는 의약품 검색 도구는 홈 화면 상단의 툴바(Toolbar)에 위치해 있으며 어느 화면에 있던 항상 고정되어 있습니다. 의약품 검색 도구를 활용하여 자주 사용하는 검색 기능을 빠르게 이용할 수 있습니다.

Drug Interactions	IV Compatibility	Drug ID	Drug Comparison	CareNotes	NeoFax [®] / Pediatrics	Tox & Drug Product Lookup	RED BOOK	Calculators	Formulary
-------------------	------------------	---------	-----------------	-----------	----------------------------------	---------------------------	----------	-------------	-----------

① 약물 상호작용 도구 (Drug Interactions)

약물에 대한 여러 상호작용 정보를 한 번에 분석해서 보여주는 도구로, 총 9가지 상호작용 정보(약물-약물, 첨가제 중복, 알러지, 음식, 술, 검사, 담배, 임부, 수유부)를 제공합니다. 환자가 복용 중인 전체 약물과 함께 환자가 알러지 정보를 동시에 입력하여 분석할 수 있습니다.

[약물 상호작용 검색 페이지]

Drug interactions search

Add at least one drug and tap view interactions.

Drugs

Acetaminophen x

Find a drug

Allergies *optional

PEANUTS x

Find an allergy

View interactions →

Clear all

[약물 상호작용 검색 결과]

Results summary

Submitted search ▾

Drug(s): Acetaminophen

Allergies: PEANUTS x

Expand All

	Drug-Drug Interactions (27)	▽
	Ingredient Duplication (0)	▽
	Drug-ALLERGY Interactions (0)	▽
	Drug-FOOD Interactions (1)	▽
	Drug-ETHANOL Interactions (1)	▽
	Drug-LAB Interactions (2)	▽
	Drug-TOBACCO Interactions (1)	▽
	Drug-PREGNANCY Interactions (1)	▽
	Drug-LACTATION Interactions (1)	▽

[약물 상호작용 상세정보]

Interactions: Drug-Ethanol

Drugs: ACETAMINOPHEN

WARNING:

Concurrent use of ACETAMINOPHEN and ETHANOL may result in an increased risk of hepatotoxicity.

CLINICAL MANAGEMENT:

Concurrent use of alcohol and acetaminophen may increase the CYP2E1-mediated metabolism of acetaminophen to the highly hepatotoxic metabolite NAPQI. Patients should be advised not to exceed 4 grams of acetaminophen in 24 hours and to tell their doctor if they regularly drink 3 or more alcoholic drinks per day (Prod Info Tylenol®, 2000). In chronic alcoholics, therapeutic doses or overdoses of acetaminophen are more likely to cause hepatotoxicity than in non-alcoholic patients (Barker et al, 1977; McClain et al, 1980; Johnson et al, 1981; McLunkin et al, 1976; Licht et al, 1980). In regular users of alcohol, the highest risk of acetaminophen toxicity occurs after a brief (12 hours) abstinence of alcohol, since CYP2E1 is still induced but ethanol is not present to compete for CYP2E1 (Draganov et al, 2000). The risk of acute liver failure is higher in individuals with underlying liver disease and in individuals who ingest alcohol while taking acetaminophen (Prod Info Butalbital acetaminophen oral capsules, 2019; Prod Info Butalbital acetaminophen oral tablets, 2022).

ONSET:

Delayed

SEVERITY:

S Major ⓘ

DOCUMENTATION:

Good ⓘ

② 주사제 호환성 도구 (IV Compatibility)

Trissel's™ 2 주사제 호환성 정보를 기반으로 여러 약물을 동시에 정맥 주사할 때의 호환성 정보를 제공하는 도구로 총 5가지 정보(Solution, Y-Site, Admixture, Syringe, TPN/TNA)를 제공합니다.

상세정보에서는 연구방법(연구기간, 저장상태 등)을 명시하고 물리적/화학적 호환성 정보를 종합적으로 제시하고 있습니다.

[주사제 호환성 검색 페이지]

IV Compatibility

Add at least one drug and press View Compatibility

Drugs (2414)

▽ Find a Drug ⓘ

Solutions (234) *optional

▽ Find a Solution ⓘ

View Compatibility →

Clear All

Popular Drug Pair Compatibility Searches

[Magnesium Sulfate - Potassium Chloride](#) →
[Vancomycin Hydrochloride - Piperacillin Sodium/Tazobactam Sodium \(Zosyn\)](#) →
[Cefepime Hydrochloride - Vancomycin Hydrochloride](#) →
[Piperacillin Sodium/Tazobactam Sodium \(Zosyn\) - Potassium Chloride](#) →
[Cefepime Hydrochloride - meropenem sodium](#) →
[Azithromycin - ceftriaxone sodium](#) →

Show more...

Powered by Trissel's™ 2 Clinical Pharmaceuticals Database (Parenteral Compatibility).

IV Index contains the Proprietary Information of BAXTER HEALTHCARE CORPORATION. Use of IV Index or information which it contains by anyone other than an expressed licensee is strictly prohibited.

[주사제 호환성 검색 결과]

Preparation and Storage

Drugs:

Clarithromycin

Vancocin HCl

Warfarin Sodium

Filter results

Administration Method

☒ Y-Site
 ☐ Admixture
 ☐ Syringe

Compatibility

☒ Compatible
 ☐ Incompatible
 ☒ Uncertain
 ☒ No Data

Drugs

All (3)

Apply Filters

Reset Filters

Drug-Drug Drug-Solution TPN

Page View Chart List

Drug	Clarithromycin	Vancomycin Hydrochloride	Warfarin Sodium
Clarithromycin		Y-Site 2 Results	Y-Site No Data
Vancomycin Hydrochloride	Y-Site 2 Results		Y-Site 2 Results 4 Results
Warfarin Sodium	Y-Site No Data	Y-Site 2 Results 4 Results	

Powered by Triselle's™ 2 Clinical Pharmaceuticals Database (Parenteral Compatibility).
 IV Index contains the Proprietary Information of BAXTER HEALTHCARE CORPORATION. Use of IV Index or information which it contains by anyone other than an expressed licensee is strictly prohibited.

[주사제 호환성 상세정보]

IV Compatibility Results Detail

Drug-Drug Y-Site Test Results

Vancomycin Hydrochloride - Clarithromycin

Results: 2

Collapse All

Filter results

Key

Study 1

Clarithromycin 50 mg/mL in Reconstituted solution, undiluted

Vancomycin Hydrochloride 10 mg/mL in Dextrose 5% in Water

Drug 1:

Clarithromycin

50 mg/mL in Reconstituted solution, undiluted

Manufacturer Unspecified

Drug 2:

Vancomycin Hydrochloride

10 mg/mL in Dextrose 5% in Water

Vancocin HCl, Tyzavan, Eli Lilly and Co.

Status:

Information:

Physical Compatibility:

Physically compatible. No visible haze or particulate formation, color change, or gas evolution.

Chemical Stability:

Chemically stable. Less than 7% loss of both drugs was found.

Storage:

Stored at 37 °C to mimic stopping the infusion flow.

Test Parameters:

Container:

Glass vials.

Study Period:

One hour.

Method:

Visual observation, electronic particle analysis, and stability-indicating HPLC analysis of drug concentrations.

Reference:

1182

③ 약물 식별 정보 도구 (Drug ID)

의약품의 식별정보(식별표시, 색상, 모양 등)를 이용하여 약물 식별을 도와주는 도구로, 식별표시만으로 간단하게 검색하는 기능과 색상, 모양, 패턴을 통해 검색하는 2가지로 나누어져 있습니다. 외국인 환자의 환자 지침약 점검 시 유용하게 활용될 수 있는 도구입니다.

[식별표시를 이용한 검색]

Drug Identification

Search: by Imprint Code | No Imprint Code? Click here to search by Description ▶

Side 1:

Partial Imprint

Side 2:

Partial Imprint

Clear

Search

[색상, 모양, 패턴을 이용한 검색]

Drug Identification

Search: by Description [Click here to search by Imprint Code](#)

☐ Black
 ☐ Blue
 ☐ Brown
 ☐ Clear
 ☐ Gold
 ☐ Gray
 ☐ Green
 ☐ Off-White
 ☐ Orange
 ☐ Pink
 ☐ Purple
 ☐ Red
 ☐ Tan
 ☐ White
 ☐ Yellow

Shape:
 Pattern:
☒ Show Images with results

④ 약물 비교 정보 도구 (Drug Comparison)

2가지 약물의 요약정보를 병렬적으로 보여주는 도구 입니다. 동일 계열 약물의 정보를 비교하고자 할 때 유용하게 활용될 수 있습니다.

[약물 비교 정보 도구 예시]

Drug Comparison Results

Display in Column 1

Amoxapine

Display in Column 2

Amoxicillin

Update

[Jump To: Top of Page](#) | [Dosing & Indications](#) | [Black Box Warnings](#) | [Contraindications/Warnings](#) | [Drug Interactions \(Single\)](#) | [Adverse Effects](#) | [Name Info](#) | [Mechanism of Action/Pharmacokinetics](#) | [Administration/Monitoring](#) | [How Supplied](#) | [Toxicology](#) | [Clinical Teaching](#) | [References](#)

Amoxapine

View Detailed information in DRUGDEX

Dosing & Indications

Adult Dosing

View Detailed information in DRUGDEX

- Depression: initial, 50 mg ORALLY 2-3 times a day; may increase dosage up to 100 mg 2-3 times a day by end of the first week OR may start with 300 mg/day, but notable sedation may occur during the first few days of therapy
- Depression: maintenance, usual effective dose is 120-300 mg/day ORALLY; may increase dosage to 400 mg/day after 3 weeks if there is inadequate response and hospitalized patients with no history of convulsive seizures may have the dose raised cautiously up to 600 mg/day in divided doses
- Endogenous depression: initial, 50 mg ORALLY 2-3 times a day; may increase dosage up to 100 mg 2-3 times a day by end of the first week OR may start with 300 mg/day, but notable sedation may occur during the first few days of therapy
- Endogenous depression: maintenance, usual effective dose is 120-300 mg/day ORALLY; may increase dosage to 400 mg/day after 3 weeks if there is inadequate response and hospitalized patients with no history of convulsive seizures may have the dose raised cautiously up to 600 mg/day in divided doses
- Severe major depression with psychotic features: initial, 50 mg ORALLY 2-3

Amoxicillin

View Detailed information in DRUGDEX

Dosing & Indications

Adult Dosing

View Detailed information in DRUGDEX

- Acute otitis media: mild to moderate infection, 500 mg ORALLY every 12 hr or 250 mg ORALLY every 8 hr [2]
- Acute otitis media: severe infection, 875 mg ORALLY every 12 hr or 500 mg ORALLY every 8 hr [2]
- Bacterial endocarditis; Prophylaxis: (high-risk patients only; dental, respiratory or infected skin/skin structure procedures) 2 g ORALLY 30 to 60 minutes prior to procedure [3]
- Chlamydial infection: (pregnant women) 500 mg ORALLY 3 times daily for 7 days [4]
- Ear, nose, and throat infection: mild to moderate infection, 500 mg ORALLY every 12 hr or 250 mg ORALLY every 8 hr [2]
- Ear, nose, and throat infection: severe infection, 875 mg ORALLY every 12 hr or 500 mg ORALLY every 8 hr [2]
- Gonorrhea, Acute uncomplicated anogenital and urethral infections due to N

⑤ 환자 교육자료 (CareNotes)

CareNotes는 환자 교육에 필요한 자료를 제공하는 도구로 약물 정보 뿐만 아니라 질병 정보, 검사, 치료, 추후 관리의 총체적인 내용을 포함하고 있습니다. 일반, 입원 전, 입원, 퇴원, 지속관리 대상 환자 등 다양한 상황의 환자에게 적합한 자료를 제공합니다.

또한 CareNotes는 총 15가지 언어(영어, 러시아어, 스페인어 등)의 교육자료를 지원하고 있어 외

국민 환자 교육 시 유용한 자료가 될 수 있습니다.

[복약정보 검색 페이지]

[약물 검색 결과]

Your Search: nitroglycerin

Go To: [Care and Condition Titles \(0 titles\)](#) [Drug Titles \(7 titles\)](#) [Lab Titles \(0 titles\)](#)

Drug Titles: (7 titles)

- ☐ Nitroglycerin, Rapid Release (Oral) (Spray, Tablet) [🔍](#)
- ☐ Nitroglycerin/Dextrose Premix (Injection) (Injectable) [🔍](#)
- ☐ Nitroglycerin (Injection) (Injectable) [🔍](#)
- ☐ Nitroglycerin (Oral) (Tablet, Capsule, Extended Release, Tablet, Extended Release) [🔍](#)
- ☐ Nitroglycerin (Rectal) (Ointment) [🔍](#)
- ☐ Nitroglycerin Ointment (Transdermal) (Ointment) [🔍](#)
- ☐ Nitroglycerin Patch (Transdermal) (Patch, Extended Release) [🔍](#)

[질병 검색 결과]

Your Search: ASTHMA

Care & Condition Titles	Document Type	Languages
ASTHMA	General Information	☒ English
	Inpatient Care	☐ Spanish
	Discharge Care	☐ English
		☐ Spanish
		☐ English
		☐ Spanish
		☐ Arabic
		☐ Chinese (Simpli...
		☐ Chinese (Tradit...
		☐ French (Canada...
		☐ German
		☐ Italian
		☐ Japanese
		☐ Korean
		☐ Polish
		☐ Portuguese (Bra...
		☐ Russian
		☐ Turkish
		☐ Vietnamese
		☐ English
		☐ Spanish
	AfterCare(R) Instructions(ER/ED)	

[복약 상세정보]

Albuterol (Inhalation) (Aerosol, Aerosol Powder, Solution) - DrugNote
Albuterol (By breathing) Albuterol (al-BUE-ter-ol) Treats or prevents bronchospasm. Brand Name(s): AccuNeb , Novapilus Ventolin HFA , ProAir HFA , Proventil , Proventil HFA , ReliOn Ventolin HFA , Ventolin HFA There may be other brand names for this medicine. When This Medicine Should Not Be Used: This medicine is not right for everyone. Do not use it if you had an allergic reaction to albuterol. How to Use This Medicine: Aerosol, Powder Under Pressure, Solution - Take your medicine as directed. This medicine is used with either a metered-dose inhaler or a nebulizer. Solution: You will use this medicine with an inhaler device called a nebulizer. The nebulizer turns the medicine into a fine mist that you breathe in through your mouth and to your lungs. Your caregiver will show you how to use your nebulizer. - Store unopened vials of this medicine at room temperature, away from heat and direct light. Do not freeze. An open vial of medicine must be used right away. Aerosol: You will use this medicine with a device called a metered-dose inhaler. The inhaler fits on the medicine canister and turns the medicine into a fine spray that you breathe in through your mouth and to your lungs. You may be told to use a spacer, which is a tube that is placed between the inhaler and your mouth. Your caregiver will show you how to use your inhaler and the spacer (if needed). - To use the inhaler: - Remove the cap and look at the mouthpiece to make sure it is clean. - Shake the inhaler well just before each use. Avoid spraying this medicine into your eyes. - Test spray in the air before using for the first time or if the inhaler has not been used for a while. - If you are supposed to use more than one puff, wait 1 to 2 minutes before inhaling the second puff. Repeat these steps for the next puff, starting with shaking the inhaler. - When you have finished all your inhalations, rinse your mouth out with water. - Clean the inhaler mouthpiece at least once a week with warm running water for 30 seconds. Let it air dry completely. - If you need to use the inhaler before it is completely dry, shake off the excess water, replace the canister, and spray it 2 times in the air away from the face. Use your regular dose. Wash the mouthpiece again and dry it completely. - Store the canister at room temperature, away from heat and direct light. Do not freeze. Do not keep this medicine inside a car where it could be exposed to extreme heat or cold. Do not poke holes in the canister or throw it into a fire, even if the canister is empty. Missed dose: Take a dose as soon as you remember. If it is almost time for your next dose, wait until then and take a regular dose. Do not take extra medicine to make up for a missed dose. - Read and follow the patient instructions that come with this medicine. Talk to your doctor or pharmacist if you have any questions. Drugs and Foods to Avoid: Ask your doctor or pharmacist before using any other medicine, including over-the-counter medicines, vitamins, and herbal products. - Some medicines can affect how albuterol works. Tell your doctor if you are also using digoxin, blood pressure medicine, any other inhaled medicine, or a diuretic (water pill). Tell your doctor if you have used medicine for

⑥ 계산기(Calculators)

임상 현장에서 많이 활용되고 있는 약물 계산기를 모아놓은 도구입니다.

[계산기 화면]

Calculators

All Calculators

Alphabetical Order

By Category

Frequent Use Calculators

Unit and Dose Converters

Medical Equations

Clinical Criteria

Decision Trees

By Specialty

All Specialties

Pharmacology

Nursing

Medical Statistics

Math Calculator

Math Calculator

About

Glossary

References

All Calculators

Alphabetical Order

▽

Find a calculator

×

⊞

Or click a letter to jump to that section. Click on a link below to use a formula or criteria.

이동 위치: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Displaying 767 calculators

A

A-a Gradient

a/A Ratio

AaPO2 Correction for FIO2

ABC Score for Prediction of 30-Day Mortality in Acute GI Bleeding ^{New!}

ABCD Rule Predicting Stroke Within 7 Days of a TIA

ABCD2 Score to Predict Stroke Risk after TIA

제 3장: 모바일 Micromedex 이용하기

언제 어디서나 Micromedex의 정보를 이용하실 수 있도록 모바일 앱을 제공하고 있습니다.

[앱 다운로드 및 사용방법]

1. Google Play Store에서 'Micromedex'를 키워드로 검색해주세요.
2. 'Micromedex'을 선택하고 다운로드 받습니다.
3. 앱을 실행하면 인증번호를 확인할 수있습니다..
4. Micromedex 웹 홈페이지 오른쪽 상단 'Mobile access'에 들어가시어 4 -b [Follow the link to activate new mobile app](#) 을 클릭하여 앱에 표시된 인증번호를 입력합니다.

The screenshot shows the Micromedex website interface. At the top right, the 'Mobile access' link is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there is a search bar with the placeholder text 'Search drug, disease, toxicology and more'. Further down, the 'Activate Now' section is displayed, featuring a text input field labeled 'Enter registration code' and a button labeled 'Activate Device'.

감사합니다.

주식회사 김스는 Merative 사에서 제공하는 Micromedex를 독점적으로 국내에 공식 수입, 배포하고 있습니다. 궁금하신 사항은 아래로 연락 주시기 바랍니다.



김보미 Julia Kim

CDS팀 / 차장 | Clinical Decision Solutions Team / Senior Manager

서울시 강남구 테헤란로 8길 33 1층(역삼동, 청원빌딩)

M: +82 10 4816 4921

F: +82 2 3019 9380